

APPORTO PROTEICO NELL'IRC

PAZIENTE OSPEDALIZZATO CON IRC SENZA MALATTIA ACUTA O CRITICA: 0,6 E 0,8 G / KG BW/DIE

PAZIENTE OSPEDALIZZATO CON IRC E IRC TERMINALE IN DIALISI CRONICA INTERMITTENTE CONVENZIONALE SENZA MALATTIA ACUTA O CRITICA: 1,2 G / KG BW/DIE

PAZIENTE OSPEDALIZZATO CON DANNO RENALE ACUTO, DANNO RENALE ACUTO SU IRC SENZA MALATTIA ACUTA O CRITICA: 0,8 E 1,0 G / KG BW / DIE

PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON DANNO RENALE ACUTO, DANNO RENALE ACUTO SU IRC, IRC CON MALATTIA ACUTA O CRITICA, NON IN TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE: INIZIARE CON 1 G / KG BW / DIE E AUMENTARE GRADUALMENTE FINO A 1,3 G / KG BW / DIE SE TOLLERATO

PAZIENTI CRITICI CON DANNO RENALE ACUTO O DANNO RENALE ACUTO SU IRC O IRC TERMINALE IN TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE INTERMITTENTE CONVENZIONALE: 1,3-1,5 G / KG BW / DIE

PAZIENTI CRITICI CON DANNO RENALE ACUTO O DANNO RENALE ACUTO SU IRC O IRC TERMINALE SU DIALISI IN CONTINUO O PIKRT: 1,5 G / KG BW / GIORNO FINO A 1,7 G / KG BW/ DIE